

Attention : Document révisable à tout moment et doit être comparé à la dernière version en cours sur le réseau informatique

RHC-CPIas		CHOIX DES ANTISEPTIQUES ET ACTES INVASIFS CHEZ L'ADULTE			Fiche technique VERSION 3/2021
<p>ESSENTIEL</p> <ul style="list-style-type: none"> RESPECTER LE SÉCHAGE SPONTANÉ DES ANTISEPTIQUES : le temps de contact doit être suffisant pour garantir l'activité antiseptique attendue NE PAS UTILISER LA CHLORHEXIDINE en contact des : cerveau, méninges, œil, muqueuse génitale, conduit auditif, cavités internes (lavage, irrigation). L'ASSOCIATION CHLORHEXIDINE 0,25% + CHLORURE DE BENZALKONIUM 0,025% + ALCOOL BENZYLIQUE N'EST PAS CONSIDEREE COMME UN ANTISEPTIQUE ALCOOLIQUE POUR LES DISPOSITIFS: l'alcool à 70 % est recommandé (activité antimicrobienne significative et immédiate) en remplacement des antiseptiques alcooliques (Chlorhexidine et PVI), en lien avec le rôle suspecté des antiseptiques alcooliques dans l'endommagement de valves et robinets (matériovigilance). POUR L'ENFANT, se référer aux guides « Guide des bonnes pratiques de l'antiseptie chez l'enfant » - SF2H-2007 et « Recommandations pour la prévention des infections liées aux cathéters veineux centraux utilisés pour la nutrition parentérale en néonatalogie » - SF2H mai 2020 					
PEAU SAINE	NIVEAU DE RISQUE INFECTIEUX		RECOMMANDATIONS	ANTISEPTIQUE	Pour l'établissement
	HAUT	Geste chirurgical Acte d'imagerie interventionnelle	2 passages successifs d'antiseptique (éviter les « coulures » d'antiseptique : prévention des brûlures / bistouri électrique)	Antiseptique alcoolique	
		Pose de cathéter intra-vasculaire central (CVC, PICC, MIDLINE avec prolongateur intégré...)	2 passages successifs d'antiseptique	Antiseptique alcoolique Privilégier Chlorhex. à 2%	
	INTERMÉDIAIRE	Pose d'un CVP ou d'un MIDLINE sans prolongateur intégré, d'un cathéter sous-cutané, d'une aiguille sur CCI Prélèvements d'hémoculture	2 passages successifs d'antiseptique	Antiseptique alcoolique	
Réfection de pansement		<ul style="list-style-type: none"> NETTOYER (savon doux) RINCER (eau stérile ou sérum phy.) SÉCHER (compresses stériles) RÉALISER 1 passage d'antiseptique 	Antiseptique alcoolique		
BAS	Retrait d'une aiguille sur CCI	1 passage d'antiseptique	Antiseptique alcoolique		
	Injections IM, IV, SC; prélèvements sanguins (hors hémoc.)	1 passage d'antiseptique	Antiseptique alcoolique ou Alcool 70%		
MUQUEUSES ET PEAU LÉSÉE	HAUT	Geste chirurgical Acte d'imagerie interventionnelle	<ul style="list-style-type: none"> NETTOYER (savon doux liquide monodose) RINCER (eau stérile ou sérum phy.) SÉCHER (compresses stériles) RÉALISER 2 passages d'antiseptique 	Antiseptique aqueux pour OPH : povidone iodée ou produit chloré à 0,06% (proscrire la Chlorhex.)	
	INTERMÉDIAIRE	Pose de sonde vésicale, sondage évacuateur isolé	<ul style="list-style-type: none"> NETTOYER (savon doux liquide monodose) RINCER (eau stérile ou sérum phy.) SÉCHER (compresses stériles) RÉALISER 1 passage d'antiseptique 	Antiseptique aqueux (proscrire la Chlorhex.)	
DISPOSITIFS	Connectiques de perfusion, robinets, embouts de flacons (hémoc...), robinet de vidange, site de prélèvement de collecteurs à urines		1 passage d'antiseptique	Alcool à 70% *	
	Valves bidirectionnelles		FRICIONNER 15 secondes minimum septum et pas de vis avant utilisation	Alcool à 70% *	
RÉFÉRENCES	<ul style="list-style-type: none"> Antiseptie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte - SF2H 5/2016 Bonnes pratiques et gestion des risques associés aux PICC - SF2H 12/2013 + FAQ 5/2014 Bon usage des antiseptiques pour la prévention du risque infectieux chez l'adulte. CCUN Sud-Ouest - Édition 2013 Gestion préopératoire du risque infectieux - SF2H 10/2013 		<ul style="list-style-type: none"> Surveiller et prévenir les infections associées aux soins - SF2H-HCSP 9/2010. Prévention des infections associées aux CCI pour accès veineux - SF2H 3/2012 Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés -SF2H 05/2019 + FAQ V3-02/2020 		

PRODUITS	DENOMINATION	LIMITE D'UTILISATION APRES OUVERTURE
ANTISEPTIQUES en Flacons	Bétadine scrub 4%, Bétadine alcoolique 5%, Bétadine dermique, Bétadine 10% solution vaginale	6 mois à température ambiante. En HAD nous préconisons 30 jours
ANTISEPTIQUES en UNIDOSES	Bétadine, sérum physiologique	Immédiat après utilisation.
ANTISEPTIQUES Reconstituable	HIBITANE	10 jours après reconstitution.
AUTRES ANTISEPTIQUES	Biseptine, HIBISCRUB	Date limite de péremption. En HAD, nous préconisons 30 jours

Nos équipes mettent à votre disposition, collées sur les flacons, des étiquettes pré imprimées avec les délais de conservation définis par l'établissement.

Merci d'indiquer la date d'ouverture lors de la première utilisation et de respecter les délais.