








Attention : Document révisable à tout moment, doit être comparé à la dernière version en cours sur le réseau informatique.

<p>Indications</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Avant un contact avec le patient, ◇ Avant un geste aseptique ◇ Après un risque d'exposition à un produit biologique d'origine humaine ◇ Après contact avec le patient ◇ Après contact avec l'environnement du patient
<p>Matériels</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Produit hydro-alcoolique (PHA) [1 dose suffit (3ml)], conforme à la norme EN 1500.
<p>Technique</p>	<p style="text-align: center;">Technique standard par friction pour la désinfection hygiénique des mains :</p> <p>Mettre le désinfectant dans le creux des mains sèches.</p> <p>Technique par friction en 7 temps renouvelée autant de fois que nécessaire pendant la durée recommandée et jusqu'au séchage complet.</p> <p>1ère phase :</p> <p>Une paume contre l'autre</p>  <p>2ème phase :</p> <p>La paume de la main droite sur le dos de la main gauche et vice versa</p>  <p>3ème phase :</p> <p>Une paume contre l'autre, les doigts entrelacés</p>  <p>4ème phase :</p> <p>L'extérieur des doigts contre la paume de l'autre main, doigts repliés les uns sur les autres</p>  <p>5ème phase :</p> <p>Friction circulaire des pouces enchâssés dans la paume opposée</p>  <p>6ème phase :</p> <p>Friction par rotation des doigts joints dans la paume opposée</p>  <p>7ème phase :</p> <p>Friction des poignets</p> 
<p>Durée</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 30 secondes
<p>Séchage</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Par friction des mains

Ces informations étaient précédemment intégrées au protocole "Hygiène des mains HYG SO-PTC 02 V1.4".