

Attention : Document révisable à tout moment, doit être comparé à la dernière version en cours sur le réseau informatique.

| | |
|---------------------------|--|
| <p>Indications</p> | <ul style="list-style-type: none"> ◇ Mains souillées ◇ Après le retrait de gants poudrés ◇ Dans les situations spécifiques de prise en charge de patients porteurs d'agents pathogènes (Clostridium difficile, gale par exemple) |
| <p>Matériels</p> | <ul style="list-style-type: none"> ◇ Savon liquide doux réservé aux soignants ◇ Eau du robinet ◇ Essuie mains à usage unique |
| <p>Technique</p> | <p>Il s'agit de 5 étapes successives :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mouiller les mains et poignets 2. Prendre une dose de savon doux 3. Frotter 15 secondes minimum sur toute la surface mains et poignets en insistant sur les espaces interdigitaux 4. Rincer abondamment, temps de rinçage égal au temps de savonnage 5. Sécher par tamponnement avec un essuie main à usage unique. Fermer le robinet avec l'essuie mains et terminer le séchage avec un second essuie |
| <p>Durée</p> | <ul style="list-style-type: none"> ◇ Durée minimale de 30 secondes |

Ces informations étaient précédemment intégrées au protocole "Hygiène des mains HYG SO-PTC 02 V1.4".